

NattAspin™

Profilaktyka powstawania zakrzepów

**Niepowtarzalność składu
i mechanizmu działania**



**100 mg
NATTOKINAZY**

2000 FU [jednostek
fibrynolitycznych]



**6 mg
HYDROKSYTYROZOLU**

i jego pochodnych,
wyodrębnionych
z owoców oliwek




TAK

dla czystych
naczyń krwionośnych



Mechanizm działania NATTOKINAZY



1. BEZOŚREDNI ROZKŁAD FIBRYNY

Nattokinaza rozpuszcza skrzepy krwi poprzez proteolizę (enzymatyczny rozkład fibryny).

2. POŚREDNI ROZKŁAD FIBRYNY

Nattokinaza poprawia rozpuszczanie skrzepów krwi poprzez 2 mechanizmy.

2.1 Aktywacja purokinazy

Nattokinaza aktywuje konwersję prourokinazy do urokinazy – enzymu, który aktywuje konwersję plazminogenu do plazminy. Plazmina jest enzymem, który degradowuje fibrynę w skrzepach krwi.

2.2 Dezaktywacja inhibitora PAI-1

PAI-1 to inhibitor, który zapobiega rozpuszczaniu skrzepów krwi. Poprzez redukcję aktywności PAI-1, nattokinaza ułatwia działanie aktywatora plazminogenu (TPA), zwiększając w ten sposób konwersję plazminogenu do plazminy. Plazmina jest enzymem, który degradowuje fibrynę w skrzepach krwi.

TAK

dla czystych naczyń krwionośnych

PROFILAKTYKA POWSTAWANIA ZAKRZEPÓW DLA OSÓB:

-  z zaburzeniami krzepnięcia krwi (bezpieczna do stosowania z kłopidogrelem, aspiryną, heparyną)
-  długotrwale unieruchomionych
-  po rozległych zabiegach ortopedycznych, ginekologicznych i kardiologicznych
-  przyjmujących antykoncepcję doustną
-  cierpiących na żylaki lub hemoroidy
-  leczących się przeciwnowotworowo – chemioterapia, leczenie hormonalne
-  po przebytej zakrzepicy
-  po przebytym udarze lub zawale serca

RYZIKO POWSTAWANIA ZAKRZEPÓW ZWIĘKSZA SIĘ:


-  po 40 roku życia (wiek jest bezpośrednim czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych)
-  u osób z otyłością
-  osób, które prowadzą niezdrowy tryb życia: niewłaściwe odżywianie, brak aktywności fizycznej (praca siedząca/ stojąca), palenie, spożywanie alkoholu, stres



NattAspin™

Niech żyje krwioobieg!

- DZIAŁANIE SKŁADNIKÓW POTWIERDZONE BADAANIAMI NAUKOWYMI
- NIE WCHODZI W INTERAKCJĘ Z INNYMI SUBSTANCJAMI CZYNNYMI
- NIE POWODUJE SKUTKÓW UBOCZNYCH



suplement diety

30 kapsulek

Sposób użycia:

1 kapsułka dziennie
30 min przed posiłkiem,
popijając szklanką wody

SKŁAD ZALECANEJ DZIENNEJ PORCJI	1 KAPSUŁKA (0,46 G)
Ekstrakt ze sfermentowanego nasienia soi, w tym nattokinaza	100 mg 2000 FU*
Ekstrakt z owoców oliwki europejskiej	60 mg

* FU – jednostka degradacji fibryny



odpowiedni dla osób
chorych na cukrzycę



bez laktozy



bez GMO

