



Utiser™

ODPORNOŚĆ I ZDROWIE UKŁADU MOCZOWEGO



DLA PACJENTÓW:

- ❖ z objawami zakażenia układu moczowego takimi jak:
 - ból podczas oddawania moczu,
 - uczucie pieczenia,
 - częste oddawanie moczu,
 - uczucie parcia na pęcherz,
 - ból w okolicy nadłonowej
- ❖ z nawracającymi infekcjami układu moczowego
- ❖ po kuracji antybiotykowej

Utiser™

D-MANNOZA + 4 AKTYWNE
EKSTRAKTY ROŚLINNE



30 tabletek

DZIAŁANIE:



Utiser™

D-MANNOZA + 4 AKTYWNE
EKSTRAKTY ROŚLINNE



Utiser™

D-MANNOZA + 4 AKTYWNE
EKSTRAKTY ROŚLINNE

KURACJA:

2 tabletki rano i wieczorem (tj. 4 tbl. dziennie) przez pierwsze 4 dni, następnie 1 tabletki rano i wieczorem, (tj. 2 tbl. dziennie) przez 7 dni. Popić szklanką wody.

PROFILAKTYKA:


1 tabletki rano i wieczorem (tj. 2 tbl. dziennie) co najmniej 3 miesiące. Popić szklanką wody.

SKŁAD ZALECANEJ DZIENNEJ PORCJI DO SPOŻYCIA	2 TABLETKI (2,25 g)	4 TABLETKI (4,5 g)
D-mannoza	1500 mg	3000 mg
Ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej	100 mg	200 mg
Ekstrakt z liści mącznicy lekarskiej standaryzowany na zawartość: -20% arbutyny	90 mg 18 mg	180 mg 36 mg
Ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej standaryzowany na zawartość: -30% proantocyjanidyn	60 mg 18 mg	120 mg 36 mg
Ekstrakt z liści rozmarynu lekarskiego	25 mg	50 mg
Witamina D	2,5µg / 100 IU (50 % RWS*)	5µg / 200 IU (100 % RWS*)



30 tabletek

Utiser™



Cząsteczki D-MANNOZY przyczepiają się do uroplakiny, dzięki czemu bakterie nie mają możliwości przyczepienia się do błony śluzowej pęcherza. Wówczas stają się nieaktywne i są wydalane razem z moczem.

- Bogaty standaryzowany skład
- Szybkie działanie
- Nie przyczynia się do rozwoju oporności bakterii
- Można przyjmować z antybiotykami
- Dobra tolerancja

Utiser™

D-MANNOZA + 4 AKTYWNE
EKSTRAKTY ROŚLINNE



30 tabletek